VIAGGIO IN VENEZUELA DI NINO SANFILIPPO

III

CONTRIBUTION À LA CONNAISSANCE DES DYTISCIDES SUD-AMERICAINS

(3ème série)

par. F. Guignot

M. Sanfilippo de Gênes a bien voulu me confier l'étude d'une petite collection de Dytiscides qu'il a rapportés d'un voyage au Venezuela. Cette collection qui provient de la région nord-occidentale, et particulièrement de l'Estado Falcon, compte 19 espèces. Deux d'entre elles sont nouvelles: un *Desmopachria* dont la description est donnée ci-dessous et un très intéressant *Bidessini* anophtalme, que M. Sanfilippo doit décrire lui-meme.

Il y a dans le matériel un *Laccophilus*, lui aussi probablement nouveau, mais il règne actuellement, dans les espèces sudaméricaines de ce genre, un tel chaos, qu'elles réclament une révision approfondie avec examen de tous les types. Aussi serait-il imprudent de ma part pour l'instant de rédiger la description de l'espèce.

Haliplus (*Liaphlus*) *obconicus* Rég.
Pachydrus obesus Sharp
Pachydrus globusus Aubé
Desmopachria Sanfilippoi n. sp.
Liodessus affinis ab. *obscurellus* Lec.
Liodessus alternatus Rég.
Uvarus n. sp.
Laccophilus apicalis Sharp
Copelatus posticus F.
Copelatus caelatipennis Aubé
Copelatus Festai Rég.
Rhantus calidus F.
Rhantus calidus ab. *Lebasi* Aubé
Eretes sticticus var. *helvolus* Klug
Suphisellus grammopterus Sharp
Laccophilus sp.
Thermonectus circumscriptus Latr.
Megadytes Steinheili Wehn.
Megadytes giganteus Cast.

Desmopachria (*Pachriostrix*) **Sanfilippoi** n. sp.

Long. 2,8 - 3 mm. En ovale très large, un peu attenué en arrière, convexe surtout en dessous, brillant, lisse, noir et ferrugineux.

Tête ferrugineuse, finement et densement ponctuée, avec l'épistome un peu proéminent, très finement rebordé, relevé et suivi d'une légère gouttière; antennes testacées.

Pronotum ferrugineux, densement ponctué, plus éparsement sur le disque, marqué d'une forte fovéole de chaque côté du milieu, parfois absente, côtés finement rebordés et relevés.

Elytres noirs, teintés de ferrugineux aux épaules et très vaguement vers le sommet; ponctuation moyenne et très dense; une strie juxtasuturale peu profonde, abrégée en avant et en arrière; épipleures ferrugineux.

Dessous brun-noiratre; métasternum imponctué et lisse, métacoxas densement ponctuées avec le fond un peu inégal, abdomen finement et très obsolètement ponctué sur fond lisse, sauf le sternite anal à ponctuation serrée; apophyse prosternale subconique.

♂. Pénis très court, large, puis resserré et aigu au sommet; paramères quatre fois plus longs, peu larges, cultriformes, avec le bord interne rectiligne, le bord externe convexe et le sommet aigu sur le prolongement du bord interne.

Venezuela, Est.-Falcon, San Luis, Lagune di el Mamon, 1.000 m. 29-VII-1956 (Sanfilippo). Holotype dans la collection Sanfilippo.

Par son pronotum sans strie et ses élytres pourvus d'une strie suturale l'espèce appartient au sous-genre *Pachriostrix* Guign. Elle se place près de *D. dispar* Sharp, dont elle se distingue par la taille plus grande, la ponctuation élytrale non obsolète sur les côtés, et l'apophyse prosternale non bifide chez le ♂.